EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : EARL BAES

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_BAE_01	BP_BAE_01	9,15	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Moyenne	0,78	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_02	BP_BAE_02	6,97	limon	Très battant (IB : 2,04)	Moyenne	0,77	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_BAE_03	BP_BAE_04	43,42	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_BAE_04	BP_BAE_04	19,27	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_BAE_05	BP_BAE_06	3,25	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_06	BP_BAE_06	23,20	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_07	BP_BAE_08	9,86	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,85	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_08	BP_BAE_08	10,53	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,85	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

Exploitation agricole : EARL BAES

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_BAE_09	BP_BAE_09	17,48	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,86	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_10	BP_BAE_20	0,83	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,86	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_BAE_11	BP_VAN_06	0,19	limon argileux	Peu battant (IB : 1,48)	Moyenne	0,83	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_12	BP_BAE_12	4,39	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,81	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_15	BP_VAN_17	3,73	argile limoneuse	Très battant (IB : 2,14)	Absence	0,81	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_17	BP_BAE_17	9,28	argile limoneuse	Assez battant (IB : 1,93)	Moyenne	0,82	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_18	BP_BAE_18	2,02	limon sableux	Très battant (IB : 2,24)	Absence	0,62	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BAE_19	BP_BAE_20	3,01	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,86	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_BAE_20	BP_BAE_20	9,90	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,86	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_BAE_21	BP_BAE_21	0,73	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,86	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

Exploitation agricole : EARL BAES

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : EARL CHEVALLIER

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_CHE_01	BP_CHE_01	22,98	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_CHE_02	BP_CHE_03bis	3,37	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,84	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_CHE_03	BP_CHE_03	75,61	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,76	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_CHE_04	BP_CHE_04	13,70	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,71	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_CHE_05	BP_CHE_05	17,81	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,84	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_CHE_06	BP_CHE_06	7,85	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,88	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_CHE_08	BP_CHE_08	5,34	limon	Très battant (IB : 2,04)	Moyenne	0,8	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_CHE_11	BP_DOS_01	32,63	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_CHE_12	BP_CHE_03	3,86	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,76	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

Exploitation agricole : EARL CHEVALLIER

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : EARL DE BONNEUIL

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_BON_01	BP_BON_08	27,49	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,85	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
BP_BON_02	BP_BON_02	35,45	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
BP_BON_03	BP_BON_03	53,06	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,86	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
BP_BON_04	BP_BON_04	14,32	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,83	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
BP_BON_05	BP_BON_02	10,88	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,75	Absence	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture								
BP_BON_06	BP_BON_06	3,51	argile sableuse	Peu battant (IB : 0,09)	Absence	0,74	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
BP_BON_06	BP_BON_06	15,05	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,78	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
BP_BON_08	BP_BON_08	10,25	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,98)	Absence	0,85	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								
BP_BON_09	BP_BON_06	4,85	argile sableuse	Peu battant (IB : 0,09)	Absence	0,74	< 2 mois	2
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol								

Exploitation agricole : EARL DE BONNEUIL

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_BON_10	BP_BON_10	6,84	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,29)	Absence	0,78	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_BON_11	BP_BON_11	16,65	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,84	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : EARL DOSSIN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_DOS_01	BP_DOS_01	5,24	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_DOS_02	BP_DOS_04	0,08	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,85	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_DOS_03	BP_CHE_06	23,87	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,88	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_DOS_04	BP_DOS_04	17,53	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,85	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_DOS_05	BP_DOS_06	19,62	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,89	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_DOS_06	BP_DOS_06	12,64	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,89	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_DOS_07	BP_DOS_06	9,27	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,89	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_DOS_09	BP_DOS_12	0,12	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,86	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL DOSSIN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_DOS_10	BP_DOS_10	10,23	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,83	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_DOS_12	BP_DOS_12	0,05	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,86	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_DOS_14	BP_VOI_048	1,49	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_DOS_15	BP_DOS_15	19,45	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Moyenne	0,9	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_DOS_16	BP_DOS_16	24,16	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,85	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_DOS_17	BP_DOS_17	17,63	limon	Très battant (IB : 2,04)	Moyenne	0,56	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_DOS_20	BP_CHE_06	7,10	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,88	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : EARL DU MARAIS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_MAR_02	BP_MAR_02	9,29	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,85	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_03	BP_MAR_03	5,00	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,84	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_MAR_05	BP_VOI_036	3,19	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Moyenne	0,26	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_06	BP_MAR_06	5,44	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,9	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_MAR_07	BP_MAR_07	6,10	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Moyenne	0,54	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_09	BP_MAR_12	1,42	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_11	BP_MAR_11	8,34	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,88	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_12	BP_MAR_12	6,55	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL DU MARAIS

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_MAR_13	BP_MAR_13	10,03	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,66	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_14	BP_MAR_14	29,64	limon	Très battant (IB : 2,04)	Moyenne	0,84	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_15	BP_MAR_12	4,69	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_16	BP_MAR_12	8,81	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,87	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_17	BUN_031	0,98	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_18	BP_VOI_006	0,88	argile	Peu battant (IB : 0,16)	Moyenne	0,76	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_19	BP_MAR_20	1,20	argile	Peu battant (IB : 0,16)	Moyenne	0,82	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_MAR_20	BP_MAR_20	2,25	argile	Peu battant (IB : 0,16)	Moyenne	0,82	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : EARL FERME DE BUNY

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BUN_001	BUN_024	19,62	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_002	BUN_002bis	28,18	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,42	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_003	BUN_003	4,22	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,29)	Moyenne	0,26	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_006	BUN_028	0,02	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,14	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_007	BUN_026	13,95	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,71	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_008	BUN_026	10,84	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,71	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_009	BUN_009	16,01	limon	Très battant (IB : 2,04)	Moyenne	0,55	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_011	BUN_011	5,39	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,33	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus							

Exploitation agricole : EARL FERME DE BUNY

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	proche des besoins de la culture							
BUN_013	BP_VOI_012	0,79	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_014	BUN_011	1,93	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,33	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_015	BUN_028	0,01	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,14	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_016	BUN_016	4,32	limon	Très battant (IB : 2,04)	Moyenne	0,28	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_020	BUN_020	4,12	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	1,05	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_021	BUN_021	2,08	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,86	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_022	BUN_003	0,92	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,29)	Moyenne	0,26	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_023	BUN_023	0,15	argile	Peu battant (IB : 0,16)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_024	BUN_024	3,95	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_025	BUN_025	6,08	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,82	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : EARL FERME DE BUNY

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BUN_026	BUN_026	3,75	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,71	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_027	BUN_003	4,42	limon sablo-argileux	Peu battant (IB : 1,29)	Moyenne	0,26	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_028	BUN_028	1,50	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,14	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_029	BUN_011	1,70	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,33	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_030	BUN_002bis	0,22	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,42	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_031	BUN_031	3,22	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BUN_032	BP_MAR_20	0,38	argile	Peu battant (IB : 0,16)	Moyenne	0,82	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : LAMORINIERE Arnaud

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_LAM_02	BP_LAM_02	105,14	limon	Très battant (IB : 2,04)	Moyenne	0,89	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_04	BP_LAM_04	15,10	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,88	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_06	BP_LAM_04	9,38	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,88	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_07	BP_LAM_01	1,11	limon argileux	Peu battant (IB : 1,22)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_10	BP_LAM_10	1,57	limon	Très battant (IB : 2,04)	Moyenne	0,71	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_LAM_11	BP_LAM_12	7,50	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,84	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_12	BP_LAM_12	26,55	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,84	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_13	BP_LAM_13	9,10	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Moyenne	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus							

Exploitation agricole : LAMORINIERE Arnaud

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	proche des besoins de la culture							
BP_LAM_15	BP_LAM_15	13,72	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,81	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_LAM_16	BP_LAM_16	0,01	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,39	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_17	BP_LAM_01	0,08	limon argileux	Peu battant (IB : 1,22)	Absence	0,89	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_22	BP_LAM_22	2,30	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_23	BP_LAM_22	3,24	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_LAM_24	BP_LAM_24	1,94	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,88	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : SARL VAN HAMME

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_VAN_01	BP_VAN_01	36,30	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,9	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_02	BP_VAN_02	25,72	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Moyenne	0,73	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_03	BP_VAN_04	18,65	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,73	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_06	BP_VAN_06	9,51	limon argileux	Peu battant (IB : 1,48)	Moyenne	0,83	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_07	BP_VAN_07	0,35	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_08	BP_VAN_08	10,51	argile	Peu battant (IB : 0,16)	Absence	0,8	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_09	BP_VAN_09	6,80	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VAN_10	BP_BAE_18	1,20	limon sableux	Très battant (IB : 2,24)	Absence	0,62	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_11	BP_VAN_11	25,71	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,79	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne							

Exploitation agricole : SARL VAN HAMME

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
	limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_12	BP_VAN_12	2,28	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,84	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VAN_13	BP_VAN_13	18,98	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,78	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_14	BP_VAN_14	15,98	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Moyenne	0,85	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VAN_15	BP_VAN_02	4,45	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Moyenne	0,73	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_16	BP_VAN_16	10,63	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,84	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_17	BP_VAN_17	8,05	argile limoneuse	Très battant (IB : 2,14)	Absence	0,81	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VAN_18	BP_VAN_13	1,79	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,78	De 2 à 6 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place.Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : SCEA CARBONNAUX GUIZANCOURT

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_CAR_01	BP_CAR_01	77,09	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_CAR_02	BP_CAR_01	30,26	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_CAR_03	BP_CAR_06	39,40	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,96	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_CAR_04	BP_CAR_01	16,86	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,93	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_CAR_06	BP_CAR_06	49,88	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,96	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_CAR_07	BP_CAR_07	17,47	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,94	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_CAR_08	BP_CAR_07	74,99	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,94	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques

Périmètre d'épandage : BIS PONT
Unité de production : BISPONT BIOGAZ

Produit d'épandage : Digestat Liquide
Rapport C/N : Inférieur à 8 - Tenue en tas : Liquide

Exploitation agricole : SCEA VOISIN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_VOI_004	BP_VOI_006	0,16	argile	Peu battant (IB : 0,16)	Moyenne	0,76	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_006	BP_VOI_006	2,92	argile	Peu battant (IB : 0,16)	Moyenne	0,76	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_007	BP_VOI_007	1,21	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VOI_008	BP_VAN_07	1,09	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,87	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VOI_009	BP_VOI_009	14,66	limon sableux	Très battant (IB : 2,24)	Absence	0,72	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VOI_011	BP_VOI_012	4,64	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_012	BP_VOI_012	12,57	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_013	BP_VOI_009	15,58	limon sableux	Très battant (IB : 2,24)	Absence	0,72	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

Exploitation agricole : SCEA VOISIN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_VOI_014	BP_VOI_017	0,62	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_015	BP_VOI_017	7,11	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_017	BP_VOI_017	4,98	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_021	BP_VOI_012	17,31	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_022	BP_VOI_012	10,84	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_023	BP_VOI_023	9,87	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,81	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_025	BP_VOI_025	1,38	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,86	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_026	BP_VOI_009	0,55	limon sableux	Très battant (IB : 2,24)	Absence	0,72	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VOI_027	BP_VOI_017	0,07	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_028	BP_VOI_028	6,13	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,95	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_030	BP_VOI_030	14,83	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,86	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : SCEA VOISIN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_VOI_035	BP_VOI_035	6,73	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,84	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_036	BP_VOI_036	8,76	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Moyenne	0,26	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_037	BP_VOI_037	1,84	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,93	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VOI_039	BP_VOI_039	7,51	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,86	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_041	BP_VOI_012	0,83	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_042	BP_VOI_042	3,30	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,89	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VOI_043	BP_DOS_10	0,43	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,83	< 2 mois	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VOI_047	BP_VOI_048	2,90	argile limoneuse	Peu battant (IB : 0,97)	Absence	0,85	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_049	BP_VOI_012	3,79	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,88	Absence	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_051	BP_VOI_037	0,12	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,93	De 2 à 6 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VOI_052	BP_VOI_52	1,98	limon	Très battant (IB : 2,08)	Absence	0,89	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							

Exploitation agricole : SCEA VOISIN

Parcelle	Sondage	Surface épandable (ha)	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engor-gement	Apt. à l'épand. (Sandre)*
BP_VOI_053	BP_LAM_12	32,22	limon	Très battant (IB : 2,04)	Absence	0,84	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_054	BP_VOI_054	6,97	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Moyenne	0,19	Absence	2
	Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture							
BP_VOI_10	BP_VOI_042	30,27	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,89	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							
BP_VOI_24	BP_VOI_042	21,48	limon argileux	Peu battant (IB : 1,45)	Absence	0,89	< 2 mois	2
	Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol							

** 1 : Sans contrainte - 2 : Sous contrainte - 3 : Interdit*